

# Cukrovarský rybník

sportovní rybářský revír

Orientačním ukazatelem kvality vodního prostředí a přiměřenosti rybí obsádky je průhlednost vody, která by měla být vždy do 30.6. vyšší než 50 cm

průhlednost vody 2014	měsíc	1/14	2/14	3/14	4/14	5/14	6/14	7/14	8/14	9/14	10/14	11/14	12/14
	cm					50	50	50	50	50	50	45	50
	pozn.	rekonstrukce				hnědá	hnědá	hnědá	zel.hnědá	zelená	zelená	zel.hnědá	hnědá

  

průhlednost vody 2015	měsíc	1/15	2/15	3/15	4/15	5/15	6/15	7/15	8/15	9/15	10/15	11/15	12/15
	cm	30		30	35	40	40	35	35	35	40	40	-
	pozn.	zelená	led	hnědá	hnědá	hnědá	hnědá	zelená	zelená	zelená	hnědá	hnědá	-

  

průhlednost vody 2016	měsíc	1/16	2/16	3/16	4/16	5/16	6/16	7/16	8/16	9/16	10/16	11/16	12/16
	cm		40	40	40	50	50	50	50	30	10	30	30
	pozn.	led	hnědá	hnědá	hnědá	hnědá	zelenohně.	hnědá	zelenohně.	zelená	hnědá	zelenohně.	hnědá

  

průhlednost vody 2017	měsíc	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	6/17	7/17	8/17	9/17	10/17	11/17	12/17
	cm			40	35	40	40	40	40	40	40	50	50
	pozn.	led	led	hnědá	hnědá	hnědozel.	hnědá	hnědozel.	hnědá	hnědá	hnědá	hnědá	hnědá

průměr
49
50

celoroční  
do 30.6.

průměr
36
35

celoroční  
do 30.6.

průměr
38
44

celoroční  
do 30.6.

průměr
42
39

celoroční  
do 30.6.